

BACTERIËLE ZIEKTEN

Nationaal Referentiecentrum voor meningokokken

INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

Tijdens het eerste trimester van 2025:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 33 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 15 in januari, 10 in februari en 8 in maart;
- ◇ werd in 66,7% van de gevallen serogroep B gevonden, in 18,2% serogroep Y, in 12,1% serogroep W en in 3,0% serogroep C.
- ◇ werden er 4 letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 54,5% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 39,4% in Wallonië en 6,1% in Brussel;
- ◇ werden er 16 stammen geïsoleerd bij mannen en 17 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,94);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 15,2% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 9,1%;

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het eerste trimester van 2025 lag hoger dan in 2024 (N=22) en is daarmee terug op het niveau van vóór de pandemie. De proportie MenB is opnieuw toegenomen, maar voornamelijk bij kinderen >5 jaar en volwassenen en minder bij jonge kinderen <5 jaar.

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	12,1%	Waals-Brabant	6.1%
Vlaams-Brabant	3.0%	Henegouwen	21.2%
West-Vlaanderen	18.2%	Luik	3.0%
Oost-Vlaanderen	15.2%	Luxemburg	3.0%
Limburg	6.1%	Namen	6.1%
Vlaanderen	54.5%	Wallonië	39.4%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	3	9.1	1	1		1	
1-4j.	2	6.1	2				
5-9j.	4	12.1	4				
10-14j	5	15.2	4		1		
15-19j.	3	9.1	3				1(B)
20-24j.	0	0		3			
25-44j.	3	9.1	3				1(B)
45-64j.	3	9.1	1		2		
≥65j.	10	30.3	4		3	3	2(B,W)
Totaal	33	100	22	1	6	4	

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2012-2025)

