

BACTERIËLE ZIEKTEN

Nationaal Referentiecentrum voor meningokokken

INFOBLAD

Meningokokkeninfecties

Tijdens het tweede trimester van 2025:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 15 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 8 in april, 4 in mei en 3 in juni;
- ◇ werd in 46,7% van de gevallen serogroep B gevonden, serogroep W in 46,7% van de gevallen en serogroep Y in 6,7% van de gevallen.
- ◇ werden er geen letale gevallen gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 46,7% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 46,7% in Wallonië en 6,7% in Brussel;
- ◇ werden er 7 stammen geïsoleerd bij mannen en 8 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 0,88);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 33,3% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 0,0%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het tweede trimester van 2025 lag iets lager dan in 2024 (N=21). Er werden opvallend minder gevallen van serogroep Y geobserveerd.

Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	6,7%	Waals-Brabant	20,0%
Vlaams-Brabant	13,3%	Henegouwen	13,3%
West-Vlaanderen	6,7%	Luik	13,3%
Oost-Vlaanderen	13,3%	Luxemburg	0,0%
Limburg	6,7%	Namen	0,0%
Vlaanderen	46,7%	Wallonië	46,7%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	B	C	Y	W	doden
0-11m.	3	20.0	2			1	
1-4j.	2	13.3	1			1	
5-9j.	0	0.0					
10-14j	0	0.0					
15-19j.	0	0.0					
20-24j.	1	6.7	1				
25-44j.	1	6.7			1		
45-64j.	2	13.3				2	
≥65j.	6	40.0	3			3	
Totaal	15	100.0	7		1	7	0

Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2012-2025)

